

他社品と効能・効果、用法・用量が異なる製品一覧

ニプロ株式会社

ニプロ販売品(有効成分)	他社品	違いのある効能・効果等
アジルサルタン錠 10mg・20mg・40mg「ニプロ」 (アジルサルタン)	アジルバ錠 10mg・20mg・40mg	○高血圧症(小児)
アリピプラゾール錠 3mg・6mg・12mg「ニプロ」 アリピプラゾール OD 錠 3mg・6mg・12mg「ニプロ」 アリピプラゾール散 1%「ニプロ」 アリピプラゾール内用液分包 3mg・6mg・12mg「ニプロ」 (アリピプラゾール)	エビリファイ錠 3mg・6mg・12mg エビリファイ OD 錠 3mg・6mg・12mg エビリファイ散 1% エビリファイ内用液 0.1%	○うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る) ○小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
エソメプラゾールカプセル 10mg・20mg「ニプロ」 (エソメプラゾールマグネシウム水和物)	ネキシウムカプセル 10mg・20mg	○逆流性食道炎の維持療法(小児) <10mgのみ> ○非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制(小児) ○低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制(小児)
エダラボン点滴静注 30mg「NP」 エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「NP」 (エダラボン)	ラジカット注 30mg ラジカット点滴静注バッグ 30mg	○筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「ニプロ」 (エリブリンメシル酸塩)	ハラヴェン静注 1mg	○悪性軟部腫瘍
ダプトマイシン静注用 350mg「ニプロ」 (ダプトマイシン)	キュビシン静注用 350mg	○敗血症、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染(小児)
炭酸ランタン顆粒分包 250mg・500mg「ニプロ」 (炭酸ランタン水和物)	ホスレノール顆粒分包 250mg・500mg	○FGFR 阻害剤投与に伴う高リン血症の改善*
デクスメトミジン静注液 200μg「ニプロ」 デクスメトミジン静注液 200μg/50mL シリンジ「ニプロ」 (デクスメトミジン塩酸塩)	プレセデックス静注液 200μg「ファイザー」 プレセデックス静注液 200μg/50mL シリンジ「ファイザー」	○小児の非挿管での非侵襲的な処置及び検査時の鎮静
トルバプタン OD 錠 7.5mg・15mg「ニプロ」 (トルバプタン)	サムスカ OD 錠 7.5mg・15mg	○抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善 ○腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制
パクリタキセル注射液 30mg・100mg「NP」 (パクリタキセル)	パクリタキセル注 30mg/5mL・100mg/16.7mL「NK」**	○進行又は再発の子宮頸癌(F法の用法・用量)

ニプロ販売品(有効成分)	他社品	違いのある効能・効果等
パロノセトロン静注 0.75mg/2mL シリンジ「NP」 (パロノセトロン塩酸塩)	アロキシ静注 0.75mg	○抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐) (遅発期を含む)[18 歳以下]
フェブキソスタット錠 10mg・20mg・40mg「ニプロ」 (フェブキソスタット)	フェブリク錠 10mg・20mg・40mg	○痛風、高尿酸血症(小児)
プロナンセリン錠 2mg・4mg・8mg「ニプロ」 (プロナンセリン)	ロナセン錠 2mg・4mg・8mg	○統合失調症(小児)
ペグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg「ニプロ」 (ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)[ペグフィルグラスチム後続 1])	ジーラスタ皮下注 3.6mg	○造血幹細胞の末梢血中への動員
リバーロキサバン OD 錠 10mg・15mg「ニプロ」 (リバーロキサバン)	イグザレルト OD 錠 10mg・15mg	○静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制 (成人) ○静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制 (小児) <10mg のみ> ○Fontan 手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制(小児)

【医薬品情報お問い合わせ先】ニプロ株式会社 医薬品情報室 TEL:0120-226-898 FAX:050-3535-8939

* :ニプロ販売品のみ適応を有する。 ** :他社後発品(先発品に当用法・用量無し)